

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	398	209	168	163
ロイシン	1.5%	678	384	300	261
リジン	1.5%	655	192	155	278
メチオニン	0.5%	217	192	146	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.7%	328	366	287	190
フェニルアラニン	0.9%	381	262	199	
チロシン	0.7%	317			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	698	419	327	322
スレオニン	0.8%	358	244	190	212
トリプトファン	0.2%	110	80	62	71
バリン	1.1%	468	279	216	172
ヒスチジン	0.9%	380	108	84	79
アルギニン	1.1%	484	192	155	225

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	398	296	250	180	118	164
ロイシン	678	504	440	410	115	123
リジン	655	487	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	328	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	698	519	380	390	136	133
スレオニン	358	266	250	210	106	127
トリプトファン	110	82	60	70	136	116
バリン	468	347	310	220	112	158
ヒスチジン	380	282	-	120	-	235
全窒素量(g)	1.3					

