

| アミノ酸(参考) | | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | | |
| | /DM | mg | NRC | | AAFCO |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 1.3% | 399 | 209 | 117 | 114 |
| ロイシン | 2.2% | 684 | 384 | 210 | 182 |
| リジン | 2.0% | 618 | 192 | 108 | 194 |
| メチオニン | 0.6% | 197 | 192 | 102 | |
| シスチン | 0.4% | 111 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 1.0% | 305 | 366 | 201 | 133 |
| フェニルアラニン | 1.2% | 378 | 262 | 139 | |
| チロシン | 1.0% | 320 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 2.3% | 698 | 419 | 228 | 225 |
| スレオニン | 1.1% | 338 | 244 | 133 | 148 |
| トリプトファン | 0.3% | 104 | 80 | 43 | 49 |
| バリン | 1.5% | 474 | 279 | 151 | 120 |
| ヒスチジン | 0.9% | 267 | 108 | 59 | 56 |
| アルギニン | 1.4% | 427 | 192 | 108 | 157 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 399 | 325 | 250 | 180 |
| ロイシン | 684 | 557 | 440 | 410 | 127 | 136 |
| リジン | 618 | 503 | 340 | 360 | 148 | 140 |
| メチオニン・シスチン計 | 305 | 249 | 220 | 160 | 113 | 155 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 698 | 568 | 380 | 390 | 149 | 146 |
| スレオニン | 338 | 275 | 250 | 210 | 110 | 131 |
| トリプトファン | 104 | 85 | 60 | 70 | 142 | 121 |
| バリン | 474 | 386 | 310 | 220 | 124 | 175 |
| ヒスチジン | 267 | 217 | - | 120 | - | 181 |
| 全窒素量(g) | 1.2 | | | | | |

