



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	368	209	122	119
ロイシン	1.9%	625	384	219	190
リジン	1.8%	576	192	113	203
メチオニン	0.6%	183	192	106	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.9%	291	366	209	138
フェニルアラニン	1.1%	351	262	145	
チロシン	0.9%	289			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	640	419	238	235
スレオニン	1.0%	322	244	138	154
トリプトファン	0.3%	99	80	45	51
バリン	1.4%	437	279	158	125
ヒスチジン	0.8%	251	108	61	58
アルギニン	1.3%	405	192	113	164

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	368	315	250	180
ロイシン	625	536	440	410	122	131
リジン	576	494	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	291	250	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	640	549	380	390	145	141
スレオニン	322	276	250	210	111	132
トリプトファン	99	85	60	70	141	121
バリン	437	375	310	220	121	170
ヒスチジン	251	216	-	120	-	180
全窒素量(g)	1.2					

