

[参考の表へ](#)

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	354	209	133	129
ロイシン	1.7%	594	384	238	206
リジン	1.5%	533	192	122	220
メチオニン	0.6%	194	192	115	
シスチン	0.3%	118			
メチオニン・シスチン計	0.9%	311	366	227	150
フェニルアラニン	1.0%	341	262	157	
チロシン	0.8%	272			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	613	419	258	255
スレオニン	0.9%	316	244	150	168
トリプトファン	0.3%	100	80	49	56
バリン	1.2%	424	279	171	136
ヒスチジン	0.9%	298	108	66	63
アルギニン	1.3%	456	192	122	178

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	354	303	250	180	121	169
ロイシン	594	509	440	410	116	124
リジン	533	456	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	311	266	220	160	121	166
フェニルアラニン・チロシン計	613	525	380	390	138	135
スレオニン	316	270	250	210	108	129
トリプトファン	100	86	60	70	143	122
バリン	424	363	310	220	117	165
ヒスチジン	298	255	-	120	-	213
全窒素量(g)	1.2					

