

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	458	209	156	151
ロイシン	1.9%	780	384	278	242
リジン	1.7%	686	192	143	258
メチオニン	0.6%	237	192	135	
シスチン	0.4%	147			
メチオニン・シスチン計	0.9%	382	366	266	176
フェニルアラニン	1.1%	458	262	184	
チロシン	0.9%	379			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	839	419	303	299
スレオニン	1.0%	394	244	176	197
トリプトファン	0.3%	128	80	57	66
バリン	1.3%	552	279	201	160
ヒスチジン	0.6%	260	108	78	74
アルギニン	1.3%	551	192	143	209

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	458	357	250	180	143	198
ロイシン	780	608	440	410	138	148
リジン	686	535	340	360	157	149
メチオニン・シスチン計	382	298	220	160	135	186
フェニルアラニン・チロシン計	839	654	380	390	172	168
スレオニン	394	307	250	210	123	146
トリプトファン	128	100	60	70	167	143
バリン	552	431	310	220	139	196
ヒスチジン	260	203	-	120	-	169
全窒素量(g)	1.3					

