

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	343	209	130	126
ロイシン	1.7%	584	384	232	201
リジン	1.6%	538	192	119	215
メチオニン	0.5%	172	192	112	
シスチン	0.3%	105			
メチオニン・シスチン計	0.8%	276	366	222	147
フェニルアラニン	1.0%	330	262	153	
チロシン	0.8%	272			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	602	419	252	249
スレオニン	0.9%	302	244	147	164
トリプトファン	0.3%	93	80	48	55
バリン	1.2%	409	279	167	133
ヒスチジン	0.7%	232	108	65	61
アルギニン	1.1%	367	192	119	174

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	343	315	250	180	126	175
ロイシン	584	537	440	410	122	131
リジン	538	494	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	276	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	602	553	380	390	146	142
スレオニン	302	278	250	210	111	132
トリプトファン	93	86	60	70	143	122
バリン	409	376	310	220	121	171
ヒスチジン	232	213	-	120	-	178
全窒素量(g)	1.1					

