

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	421	209	158	154
ロイシン	1.7%	707	384	282	245
リジン	1.5%	642	192	145	261
メチオニン	0.5%	199	192	137	
シスチン	0.3%	137			
メチオニン・シスチン計	0.8%	334	366	270	178
フェニルアラニン	1.0%	408	262	187	
チロシン	0.8%	325			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	732	419	307	303
スレオニン	0.9%	370	244	178	199
トリプトファン	0.3%	116	80	58	66
バリン	1.2%	492	279	203	162
ヒスチジン	0.7%	278	108	79	75
アルギニン	1.2%	485	192	145	212

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	421	306	250	180
ロイシン	707	514	440	410	117	125
リジン	642	466	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	334	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	732	532	380	390	140	136
スレオニン	370	268	250	210	107	128
トリプトファン	116	84	60	70	141	121
バリン	492	357	310	220	115	162
ヒスチジン	278	202	-	120	-	168
全窒素量(g)	1.4					

