

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	498	209	183
ロイシン	1.7%	837	384	327
リジン	1.6%	787	192	168
メチオニン	0.6%	273	192	159
シスチン	0.3%	159		
メチオニン・シスチン計	0.9%	433	366	312
フェニルアラニン	1.0%	485	262	216
チロシン	0.8%	385		
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	870	419	356
スレオニン	1.0%	459	244	207
トリプトファン	0.3%	138	80	67
バリン	1.2%	589	279	235
ヒスチジン	0.9%	409	108	91
アルギニン	1.3%	626	192	168

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	498	295	250	180
ロイシン	837	496	440	410	113	121
リジン	787	466	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	433	257	220	160	117	160
フェニルアラニン・チロシン計	870	515	380	390	136	132
スレオニン	459	272	250	210	109	129
トリプトファン	138	82	60	70	137	117
バリン	589	349	310	220	112	158
ヒスチジン	409	242	-	120	-	202
全窒素量(g)	1.7					

