

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.3%	335	209	98	95
ロイシン	2.2%	563	384	175	152
リジン	2.1%	537	192	90	163
メチオニン	0.7%	180	192	85	
シスチン	0.4%	106			
メチオニン・シスチン計	1.1%	285	366	168	111
フェニルアラニン	1.2%	316	262	116	
チロシン	1.0%	258			
フェニルアラニン・チロシン計	2.2%	574	419	191	188
スレオニン	1.2%	302	244	111	124
トリプトファン	0.4%	91	80	36	41
バリン	1.5%	391	279	126	101
ヒスチジン	1.0%	271	108	49	46
アルギニン	1.6%	401	192	90	132

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	335	312	250	180	125	173
ロイシン	563	524	440	410	119	128
リジン	537	500	340	360	147	139
メチオニン・シスチン計	285	265	220	160	121	166
フェニルアラニン・チロシン計	574	534	380	390	141	137
スレオニン	302	281	250	210	113	134
トリプトファン	91	85	60	70	141	121
バリン	391	363	310	220	117	165
ヒスチジン	271	252	-	120	-	210
全窒素量(g)	1.1					

