

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	316	209	110	107
ロイシン	1.8%	522	384	197	171
リジン	1.7%	483	192	102	183
メチオニン	0.5%	152	192	96	
シスチン	0.4%	106			
メチオニン・シスチン計	0.9%	257	366	189	125
フェニルアラニン	1.0%	303	262	131	
チロシン	0.8%	235			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	538	419	215	212
スレオニン	1.0%	281	244	125	139
トリプトファン	0.3%	87	80	41	46
バリン	1.2%	361	279	142	113
ヒスチジン	0.8%	225	108	55	52
アルギニン	1.4%	394	192	102	148

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	316	306	250	180
ロイシン	522	505	440	410	115	123
リジン	483	467	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	257	248	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	538	521	380	390	137	134
スレオニン	281	272	250	210	109	129
トリプトファン	87	84	60	70	140	120
バリン	361	349	310	220	113	159
ヒスチジン	225	218	-	120	-	182
全窒素量(g)	1.0					

