

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	342	209	133	129
ロイシン	1.7%	577	384	237	206
リジン	1.6%	567	192	122	220
メチオニン	0.5%	164	192	115	
シスチン	0.3%	91			
メチオニン・シスチン計	0.7%	253	366	227	150
フェニルアラニン	0.9%	317	262	157	
チロシン	0.7%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	572	419	258	255
スレオニン	0.9%	311	244	150	168
トリプトファン	0.3%	90	80	49	56
バリン	1.1%	388	279	171	136
ヒスチジン	0.8%	274	108	66	63
アルギニン	1.1%	393	192	122	178

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	342	302	250	180
ロイシン	577	509	440	410	116	124
リジン	567	501	340	360	147	139
メチオニン・シスチン計	253	224	220	160	102	140
フェニルアラニン・チロシン計	572	505	380	390	133	130
スレオニン	311	274	250	210	110	131
トリプトファン	90	80	60	70	133	114
バリン	388	342	310	220	110	156
ヒスチジン	274	242	-	120	-	202
全窒素量(g)	1.1					

