

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	312	224	120	117
ロイシン	1.6%	522	411	216	187
リジン	1.5%	484	205	111	200
メチオニン	0.5%	153	205	105	
シスチン	0.3%	107			
メチオニン・シスチン計	0.8%	258	392	206	136
フェニルアラニン	1.0%	307	280	143	
チロシン	0.8%	242			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	549	448	235	231
スレオニン	0.9%	281	261	136	152
トリプトファン	0.3%	88	86	44	51
バリン	1.2%	366	299	155	124
ヒスチジン	0.7%	218	116	60	57
アルギニン	1.2%	374	205	111	162

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	312	302	250	180	121	168
ロイシン	522	506	440	410	115	123
リジン	484	468	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	258	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	549	532	380	390	140	136
スレオニン	281	272	250	210	109	130
トリプトファン	88	85	60	70	141	121
バリン	366	355	310	220	114	161
ヒスチジン	218	211	-	120	-	176
全窒素量(g)	1.0					

