

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	394	224	148	144
ロイシン	1.7%	672	411	265	230
リジン	1.7%	661	205	136	245
メチオニン	0.5%	211	205	128	
シスチン	0.3%	120			
メチオニン・シスチン計	0.9%	332	392	253	167
フェニルアラニン	1.0%	390	280	175	
チロシン	0.8%	302			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	692	448	288	284
スレオニン	0.9%	368	261	167	187
トリプトファン	0.3%	109	86	54	62
バリン	1.2%	469	299	191	152
ヒスチジン	0.7%	286	116	74	70
アルギニン	1.3%	524	205	136	198

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	394	279	250	180
ロイシン	672	475	440	410	108	116
リジン	661	467	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	332	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	692	490	380	390	129	126
スレオニン	368	260	250	210	104	124
トリプトファン	109	77	60	70	128	110
バリン	469	332	310	220	107	151
ヒスチジン	286	203	-	120	-	169
全窒素量(g)	1.4					

