

アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	296	224	149	145
ロイシン	1.3%	511	411	266	231
リジン	1.3%	494	205	137	247
メチオニン	0.4%	156	205	129	
シスチン	0.2%	89			
メチオニン・シスチン計	0.6%	246	392	255	168
フェニルアラニン	0.8%	300	280	176	
チロシン	0.6%	228			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	528	448	290	286
スレオニン	0.7%	270	261	168	188
トリプトファン	0.2%	81	86	55	63
バリン	0.9%	342	299	192	153
ヒスチジン	0.6%	219	116	74	71
アルギニン	1.0%	401	205	137	200

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	296	286	250	180
ロイシン	511	494	440	410	112	120
リジン	494	477	340	360	140	133
メチオニン・シスチン計	246	237	220	160	108	148
フェニルアラニン・チロシン計	528	510	380	390	134	131
スレオニン	270	261	250	210	104	124
トリプトファン	81	78	60	70	130	111
バリン	342	331	310	220	107	150
ヒスチジン	219	212	-	120	-	177
全窒素量(g)	1.0					

