

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	429	224	148	145
ロイシン	1.9%	729	411	266	230
リジン	1.7%	679	205	137	246
メチオニン	0.6%	236	205	129	
シスチン	0.4%	151			
メチオニン・シスチン計	1.0%	387	392	254	168
フェニルアラニン	1.1%	430	280	176	
チロシン	0.8%	327			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	757	448	289	285
スレオニン	1.0%	401	261	168	187
トリプトファン	0.3%	124	86	55	62
バリン	1.3%	502	299	191	152
ヒスチジン	0.8%	326	116	74	70
アルギニン	1.7%	654	205	137	199

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	429	285	250	180
ロイシン	729	483	440	410	110	118
リジン	679	450	340	360	132	125
メチオニン・シスチン計	387	257	220	160	117	160
フェニルアラニン・チロシン計	757	501	380	390	132	129
スレオニン	401	266	250	210	106	127
トリプトファン	124	82	60	70	137	117
バリン	502	333	310	220	107	151
ヒスチジン	326	216	-	120	-	180
全窒素量(g)	1.5					

