

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	375	224	135	131
ロイシン	1.8%	636	411	241	209
リジン	1.7%	618	205	124	223
メチオニン	0.5%	189	205	117	
シスチン	0.3%	121			
メチオニン・シスチン計	0.9%	309	392	230	152
フェニルアラニン	1.0%	364	280	159	
チロシン	0.8%	273			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	637	448	262	259
スレオニン	1.0%	338	261	152	170
トリプトファン	0.3%	100	86	50	57
バリン	1.2%	433	299	174	138
ヒスチジン	0.8%	293	116	67	64
アルギニン	1.3%	474	205	124	181

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	375	306	250	180
ロイシン	636	519	440	410	118	127
リジン	618	504	340	360	148	140
メチオニン・シスチン計	309	252	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	637	520	380	390	137	133
スレオニン	338	275	250	210	110	131
トリプトファン	100	82	60	70	137	117
バリン	433	354	310	220	114	161
ヒスチジン	293	239	-	120	-	199
全窒素量(g)	1.2					

