



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	396	224	166	161
ロイシン	1.5%	658	411	296	257
リジン	1.5%	637	205	153	275
メチオニン	0.5%	203	205	144	
シスチン	0.3%	125			
メチオニン・シスチン計	0.8%	328	392	283	187
フェニルアラニン	0.9%	397	280	196	
チロシン	0.7%	293			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	690	448	322	318
スレオニン	0.8%	369	261	187	209
トリプトファン	0.3%	111	86	61	70
バリン	1.0%	447	299	214	170
ヒスチジン	0.8%	368	116	83	78
アルギニン	1.3%	584	205	153	222

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	396	289	250	180
ロイシン	658	480	440	410	109	117
リジン	637	464	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	328	239	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	690	503	380	390	132	129
スレオニン	369	269	250	210	108	128
トリプトファン	111	81	60	70	135	115
バリン	447	326	310	220	105	148
ヒスチジン	368	268	-	120	-	224
全窒素量(g)	1.4					

