

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.2%	412	224	131	128
ロイシン	2.0%	700	411	235	204
リジン	1.9%	666	205	121	218
メチオニン	0.6%	206	205	114	
シスチン	0.4%	132			
メチオニン・シスチン計	1.0%	339	392	225	149
フェニルアラニン	1.2%	420	280	155	
チロシン	0.9%	312			
フェニルアラニン・チロシン計	2.1%	733	448	256	252
スレオニン	1.1%	380	261	149	166
トリプトファン	0.3%	116	86	48	55
バリン	1.4%	471	299	169	135
ヒスチジン	1.0%	343	116	66	62
アルギニン	1.8%	609	205	121	176

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	412	288	250	180
ロイシン	700	489	440	410	111	119
リジン	666	465	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	339	236	220	160	107	148
フェニルアラニン・チロシン計	733	512	380	390	135	131
スレオニン	380	265	250	210	106	126
トリプトファン	116	81	60	70	135	116
バリン	471	329	310	220	106	150
ヒスチジン	343	239	-	120	-	199
全窒素量(g)	1.4					

