

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	383	224	139	136
ロイシン	1.8%	650	411	249	216
リジン	1.6%	593	205	128	231
メチオニン	0.4%	158	205	121	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.7%	268	392	238	157
フェニルアラニン	1.1%	390	280	165	
チロシン	0.8%	288			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	678	448	271	267
スレオニン	0.9%	331	261	157	176
トリプトファン	0.3%	103	86	51	59
バリン	1.2%	431	299	179	143
ヒスチジン	0.7%	266	116	70	66
アルギニン	1.3%	482	205	128	187

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	383	312	250	180
ロイシン	650	529	440	410	120	129
リジン	593	483	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	268	218	220	160	99	136
フェニルアラニン・チロシン計	678	552	380	390	145	141
スレオニン	331	270	250	210	108	128
トリプトファン	103	84	60	70	140	120
バリン	431	351	310	220	113	159
ヒスチジン	266	216	-	120	-	180
全窒素量(g)	1.2					

