



アミノ酸(参考)					
このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量			
/DM	mg	NRC		AAFCO	
		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	239	224	130	126
ロイシン	1.2%	407	411	232	201
リジン	1.0%	344	205	119	215
メチオニン	0.3%	105	205	113	
シスチン	0.3%	87			
メチオニン・シスチン計	0.6%	191	392	222	147
フェニルアラニン	0.7%	251	280	154	
チロシン	0.5%	184			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	436	448	253	249
スレオニン	0.6%	200	261	147	164
トリプトファン	0.2%	67	86	48	55
バリン	0.8%	281	299	167	133
ヒスチジン	0.4%	141	116	65	61
アルギニン	0.9%	299	205	119	174

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	239	315	250	180
ロイシン	407	536	440	410	122	131
リジン	344	453	340	360	133	126
メチオニン・シスチン計	191	252	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	436	574	380	390	151	147
スレオニン	200	264	250	210	105	126
トリプトファン	67	88	60	70	147	126
バリン	281	371	310	220	120	168
ヒスチジン	141	186	-	120	-	155
全窒素量(g)	0.8					

