

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.0%	14	224	141	137
ロイシン	0.1%	31	411	251	218
リジン	0.1%	30	205	129	233
メチオニン	0.0%	7	205	122	
シスチン	0.0%	5			
メチオニン・シスチン計	0.0%	12	392	240	159
フェニルアラニン	0.0%	18	280	166	
チロシン	0.0%	9			
フェニルアラニン・チロシン計	0.1%	27	448	274	270
スレオニン	0.1%	19	261	159	178
トリプトファン	0.0%	5	86	52	59
バリン	0.1%	23	299	181	144
ヒスチジン	0.1%	22	116	70	67
アルギニン	0.1%	23	205	129	189

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	14	398	250	180
ロイシン	31	892	440	410	203	218
リジン	30	839	340	360	247	233
メチオニン・シスチン計	12	354	220	160	161	221
フェニルアラニン・チロシン計	27	765	380	390	201	196
スレオニン	19	540	250	210	216	257
トリプトファン	5	155	60	70	258	221
バリン	23	660	310	220	213	300
ヒスチジン	22	632	-	120	-	527
全窒素量(g)	0.0					

