

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	206	224	138	135
ロイシン	1.0%	347	411	247	215
リジン	0.8%	295	205	127	229
メチオニン	0.2%	91	205	120	
シスチン	0.2%	82			
メチオニン・シスチン計	0.5%	173	392	236	156
フェニルアラニン	0.6%	224	280	164	
チロシン	0.4%	155			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	380	448	269	266
スレオニン	0.5%	179	261	156	175
トリプトファン	0.2%	60	86	51	58
バリン	0.7%	245	299	178	142
ヒスチジン	0.3%	125	116	69	65
アルギニン	0.8%	281	205	127	185

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	206	304	250	180
ロイシン	347	512	440	410	116	125
リジン	295	435	340	360	128	121
メチオニン・シスチン計	173	255	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	380	560	380	390	147	144
スレオニン	179	264	250	210	106	126
トリプトファン	60	88	60	70	146	125
バリン	245	361	310	220	116	164
ヒスチジン	125	184	-	120	-	153
全窒素量(g)	0.7					

