



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	399	224	148	144
ロイシン	1.8%	681	411	264	229
リジン	1.6%	637	205	136	245
メチオニン	0.5%	197	205	128	
シスチン	0.3%	125			
メチオニン・シスチン計	0.8%	322	392	253	167
フェニルアラニン	1.0%	399	280	175	
チロシン	0.8%	307			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	706	448	288	284
スレオニン	0.9%	360	261	167	187
トリプトファン	0.3%	113	86	54	62
バリン	1.2%	461	299	190	152
ヒスチジン	0.8%	330	116	74	70
アルギニン	1.5%	564	205	136	198

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	399	288	250	180
ロイシン	681	490	440	410	111	120
リジン	637	459	340	360	135	127
メチオニン・シスチン計	322	232	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	706	509	380	390	134	130
スレオニン	360	260	250	210	104	124
トリプトファン	113	81	60	70	136	116
バリン	461	332	310	220	107	151
ヒスチジン	330	238	-	120	-	198
全窒素量(g)	1.4					

