

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	322	224	134	130
ロイシン	1.5%	535	411	239	207
リジン	1.5%	516	205	123	221
メチオニン	0.5%	167	205	116	
シスチン	0.3%	92			
メチオニン・シスチン計	0.7%	258	392	228	151
フェニルアラニン	0.9%	304	280	158	
チロシン	0.7%	242			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	546	448	260	256
スレオニン	0.8%	287	261	151	169
トリプトファン	0.2%	88	86	49	56
バリン	1.0%	361	299	172	137
ヒスチジン	0.9%	318	116	67	63
アルギニン	1.2%	423	205	123	179

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	322	299	250	180	120	166
ロイシン	535	498	440	410	113	121
リジン	516	480	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	258	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	546	508	380	390	134	130
スレオニン	287	267	250	210	107	127
トリプトファン	88	81	60	70	136	116
バリン	361	336	310	220	108	153
ヒスチジン	318	295	-	120	-	246
全窒素量(g)	1.1					

