

ver.4 このレシピのエネルギー		135	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	0.85	日分となります									
参考の表へ		1日と与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする								
		1/30(wed)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2						
		グラム	総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！ 3.0 ～ 4.0	疾患別推奨レベル ↓この範囲内！ ～	NRC						
			水分				AAFCO					AAFCO						
			乾燥重量				体重0.75乗ベース					体重0.75乗ベース						
魚介類		大西洋さけ・養殖-生(切り身)	8	エネルギー				乾燥重量ベース			↓この範囲内！ ～	↓この範囲内！ ～	乾燥重量ベース					
豆類		絹ごし豆腐	11	エネルギー密度				エネルギー密度					エネルギー密度					
豆類		糸引き納豆	3.5	3.3 kcal/g														
</																		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	429	224	156	152
ロイシン	1.8%	734	411	280	243
リジン	1.7%	695	205	144	259
メチオニン	0.5%	223	205	136	
シスチン	0.3%	124			
メチオニン・シスチン計	0.8%	347	392	267	177
フェニルアラニン	1.0%	414	280	185	
チロシン	0.8%	342			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	756	448	304	300
スレオニン	0.9%	389	261	177	197
トリプトファン	0.3%	120	86	58	66
バリン	1.2%	505	299	202	160
ヒスチジン	0.8%	343	116	78	74
アルギニン	1.3%	553	205	144	210

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	429	292	250	180	117	162
ロイシン	734	499	440	410	113	122
リジン	695	473	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	347	236	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	756	514	380	390	135	132
スレオニン	389	264	250	210	106	126
トリプトファン	120	81	60	70	136	116
バリン	505	343	310	220	111	156
ヒスチジン	343	234	-	120	-	195
全窒素量(g)	1.5					

