

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.3%	468	224	141	137
ロイシン	2.1%	789	411	252	219
リジン	1.9%	718	205	130	234
メチオニン	0.7%	243	205	123	
シスチン	0.4%	145			
メチオニン・シスチン計	1.0%	387	392	241	160
フェニルアラニン	1.2%	458	280	167	
チロシン	1.0%	364			
フェニルアラニン・チロシン計	2.2%	822	448	275	271
スレオニン	1.1%	417	261	160	178
トリプトファン	0.4%	135	86	52	59
バリン	1.5%	540	299	182	145
ヒスチジン	1.1%	413	116	71	67
アルギニン	1.8%	655	205	130	189

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	468	292	250	180	117	162
ロイシン	789	492	440	410	112	120
リジン	718	448	340	360	132	124
メチオニン・シスチン計	387	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	822	513	380	390	135	131
スレオニン	417	260	250	210	104	124
トリプトファン	135	84	60	70	140	120
バリン	540	337	310	220	109	153
ヒスチジン	413	258	-	120	-	215
全窒素量(g)	1.6					

