

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	425	224	143
ロイシン	1.9%	716	411	255
リジン	1.8%	672	205	131
メチオニン	0.6%	215	205	124
シスチン	0.3%	127		
メチオニン・シスチン計	0.9%	341	392	244
フェニルアラニン	1.1%	412	280	169
チロシン	0.9%	327		
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	738	448	278
スレオニン	1.0%	376	261	161
トリプトファン	0.3%	119	86	53
バリン	1.3%	486	299	184
ヒスチジン	1.1%	395	116	71
アルギニン	1.5%	570	205	131

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	425	295	250	180
ロイシン	716	496	440	410	113	121
リジン	672	465	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	341	236	220	160	107	148
フェニルアラニン・チロシン計	738	511	380	390	135	131
スレオニン	376	261	250	210	104	124
トリプトファン	119	82	60	70	137	117
バリン	486	336	310	220	109	153
ヒスチジン	395	273	-	120	-	228
全窒素量(g)	1.4					

