

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	314	224	114	111
ロイシン	1.8%	531	411	205	178
リジン	1.7%	512	205	105	190
メチオニン	0.5%	165	205	99	
シスチン	0.3%	90			
メチオニン・シスチン計	0.8%	255	392	196	129
フェニルアラニン	1.0%	300	280	135	
チロシン	0.8%	234			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	535	448	223	220
スレオニン	1.0%	294	261	129	144
トリプトファン	0.3%	86	86	42	48
バリン	1.2%	364	299	147	117
ヒスチジン	0.9%	270	116	57	54
アルギニン	1.4%	429	205	105	153

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	314	296	250	180
ロイシン	531	501	440	410	114	122
リジン	512	483	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	255	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	535	505	380	390	133	129
スレオニン	294	277	250	210	111	132
トリプトファン	86	82	60	70	136	116
バリン	364	344	310	220	111	156
ヒスチジン	270	255	-	120	-	212
全窒素量(g)	1.1					

