

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	309	224	111	108
ロイシン	1.8%	514	411	198	172
リジン	1.7%	485	205	102	184
メチオニン	0.6%	166	205	96	
シスチン	0.4%	104			
メチオニン・シスチン計	0.9%	270	392	190	125
フェニルアラニン	1.0%	300	280	131	
チロシン	0.8%	235			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	534	448	216	213
スレオニン	1.0%	285	261	125	140
トリプトファン	0.3%	85	86	41	47
バリン	1.3%	370	299	143	114
ヒスチジン	0.8%	228	116	55	52
アルギニン	1.3%	369	205	102	149

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	309	288	250	180
ロイシン	514	479	440	410	109	117
リジン	485	452	340	360	133	126
メチオニン・シスチン計	270	252	220	160	115	157
フェニルアラニン・チロシン計	534	498	380	390	131	128
スレオニン	285	266	250	210	106	127
トリプトファン	85	79	60	70	132	113
バリン	370	345	310	220	111	157
ヒスチジン	228	213	-	120	-	178
全窒素量(g)	1.1					

