

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	385	224	137	134
ロイシン	1.8%	643	411	246	213
リジン	1.6%	591	205	126	228
メチオニン	0.6%	222	205	119	
シスチン	0.3%	126			
メチオニン・シスチン計	1.0%	347	392	235	155
フェニルアラニン	1.0%	364	280	163	
チロシン	0.8%	292			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	657	448	267	264
スレオニン	1.0%	347	261	155	173
トリプトファン	0.3%	107	86	51	58
バリン	1.3%	461	299	177	141
ヒスチジン	1.0%	347	116	69	65
アルギニン	1.3%	481	205	126	184

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	385	307	250	180	123	170
ロイシン	643	512	440	410	116	125
リジン	591	471	340	360	138	131
メチオニン・シスチン計	347	277	220	160	126	173
フェニルアラニン・チロシン計	657	523	380	390	138	134
スレオニン	347	277	250	210	111	132
トリプトファン	107	85	60	70	142	121
バリン	461	368	310	220	119	167
ヒスチジン	347	276	-	120	-	230
全窒素量(g)	1.3					

