|             | ver.4 このレシピのエネルギー                       | 112       | kcal 体重の0.75乗       | 1.87     | kg          | 計算では          | 0.71        | 日分となり       | Jます             |                   |                 |                |             |
|-------------|---|-----------|---------------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 参考の表へ       |   |           | kcal 体 重            | 2.3      | kg          | 実際は           | 1.0         | 日分とする       | 5               |                   |                 |                |             |
|             | 3/3(sun)                                |           | このレシピで摂取できる栄養       |          |             | このレシピでの推奨量 *1 |             | このレシピでの 推奨量 |                 |                   | このレシピでの上限量 *2   |                |             |
|             |   | グラム       | 総重量 g 153.9         |          | NRC AAFCO   |               | 老齢犬用        | 14天里        | NRC AAFO        |                   | AAFCO           |                |             |
|             |   | 7 74      | 水分                  | _        |             |               |             |             | 老師大用<br>  「小動物の | 疾患別推奨レベル          |                 |                |             |
|             |   |           | 乾燥重量                | -        |             |               | 乾燥重量<br>ベース | 乾燥重量        | 臨床栄養学」より        |                   | 体重0.75<br> 乗ベース |                | 乾燥重量<br>ベース |
| 肉類          | 若鶏・ささ身-生                                | 7         | エネルギー kc            | al 112.4 |             | *^\_^         |             | ^-^         | ↓この範囲内↓         | ↓この範囲内↓           | *^-^            |                |             |
| 豆類          | 糸引き納豆                                   | 3.5       | エネルギー密度             | 3.4      | kcal/g      |               |             |             | 3.0 ~ 4.0       | ~                 |                 |                |             |
|             | さつまいも-蒸し                                | 15        |                     |          |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
|             | りんご-生                                   | 15        |                     | _        | /DM         | /DM           | /DM         | /DM         | /DM /DM         | /DM /DM           | /DM             | /DM            | /DM         |
| 野菜類         | キャベツ-生                                  | 5         |                     |          | 24%         | 18%           | 10%         | 18%         | 15.0% ~ 23.0%   | ~                 |                 |                |             |
| 野菜類         | こまつな・葉ーゆで                               | 5         | Die ein.            |          | 16.8%       | 400           |             | - Fa        | 7.00            | ~                 |                 | 0.00/          |             |
|             | かぼちゃ(西洋)-ゆで                             | 8<br>5    |                     |          | 15%         | 10%           | 6%          | 5%          | 7.0% ~ 15.0%    | ~ ~               | 61%             | 33%            |             |
| 乳類 乳類       | ナチュラルチース・カテーシ<br>  ヨーグルト・全脂無糖           | 5         | 40-1-0-14           |          | 49%<br>6.7% |               |             |             | 2.0% ~          | ~                 |                 |                |             |
| 孔規          | コープルド・王旭無棍                              | J         |                     | i        | 9.5%        |               |             |             | 2.0%            | ~                 | -               |                |             |
|             |   |           | 灰分 星                |          | 4.1%        |               |             |             |                 | ~                 |                 |                |             |
|             |   |           | ナトリウム m             | _        | 0.21%       | 0.15%         | 0.08%       | 0.06%       | 0.15% ~ 0.35%   | 0.07% ~ 0.25%     | -               |                |             |
|             |   |           | カリウム m              | -        | 1.31%       | 0.79%         | 0.40%       | 0.60%       |                 | ~                 |                 |                |             |
|             |   |           | カルシウム m             | -        | 0.39%       | 0.73%         | 0.40%       | 0.60%       | 0.50% ∼ 1.00%   | ~                 |                 |                | 2.5%        |
|             |   |           | マグネシウム m            | g 31     | 0.093%      | 0.111%        | 0.060%      | 0.040%      |                 | ~                 |                 |                | 0.3%        |
| 肉類          | 成鶏・ささ身-生                                | 7         | リン m                | g 125    | 0.38%       | 0.56%         | 0.30%       | 0.50%       | 0.25% ~ 0.75%   | 0.20% ~ 0.30%     |                 |                | 1.6%        |
| 豆類          | 絹ごし豆腐                                   | 10        |                     | 1.04     | : 1         |               |             | 1:1         | 1.2: 1 ~ 1.4:1  | ~                 |                 |                | 2:1         |
| いも類         | さつまいも-蒸し                                | 15        |                     |          | 1           |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
| 野菜類         | キャベツ-生                                  | 5         |                     | 栄養量      |             | 栄養量           |             |             |                 | は摂りましょうという量       | 栄養量             | 栄養量            | 栄養量         |
|             | ブロッコリー・花序-ゆで                            | 5         |                     | -        |             | 2             | 1           | 3           | *2上限量:これ以上!     | は危険という量           |                 |                | 100         |
| 野菜類         | こまつな・葉ーゆで                               | 5         |                     |          |             | 4             | 2           | 4           | /DM             | <del>-</del> + 11 |                 |                | 33          |
| 野菜類         | かぼちゃ(西洋)-ゆで                             | 10<br>0.1 |                     | -        |             | 0.4           | 0.2         | 0.2         | /DM:乾燥重量        | めたり               |                 |                | 8           |
| 藻類<br>油脂類   | 刻み昆布<br> <br> フラックシシードオイル               | 0.1       |                     | Ŭ        |             | 0.3<br>312    | 167         | 0.2<br>166  |                 |                   | 13055           | 7071           | 8295        |
| 乳類          | ヨーグルト・全脂無糖                              | 20        |                     |          |             | 312           | 107         | 100         |                 |                   | 13000           | 7071           | 0290        |
| 乳類          | ナチュラルチース・カテージ                           | 5         |                     |          |             | 312           | 167         | 166         |                 |                   | 13055           | 7071           | 8295        |
| TUAR        | 7717W7 X 37 7                           |           | ビタミンD II            |          |             | 34            | 18          | 17          |                 |                   | 194             | 106            | 166         |
|             |   |           | ビタミンE II            | J 2.8    |             | 1.9           | 1.0         | 1.7         |                 |                   |                 |                | 33          |
|             |   |           | ビタミンK μ             | g 76     |             | 101           | 54          |             |                 |                   |                 |                |             |
|             |   |           | ビタミンB1 m            | g 0.1    |             | 0.1           | 0.1         | 0.0         |                 |                   |                 |                |             |
|             |   |           | ビタミンB2 m            |          |             | 0.3           | 0.2         | 0.1         |                 |                   |                 |                |             |
|             |   |           | ナイアシン m             | -        |             | 1.1           | 0.6         | 0.4         |                 |                   |                 |                |             |
|             |   |           | ビタミンB6 m            |          |             | 0.09          | 0.05        | 0.03        |                 |                   |                 |                |             |
|             |   |           | ビタミンB12 μ           | -        |             | 2.1           | 1.2         | 0.7         |                 |                   |                 |                |             |
|             |   | 錠∙杯       | 葉酸 μ<br>パントテン酸 m    |          |             | 17<br>0.9     | 0.5         | 0.3         |                 |                   |                 |                |             |
|             | Asahi エビオス錠                             | 延*作       | バントテン酸 m<br>ビタミンC m |          |             | 0.9           | 0.5         | 0.3         |                 |                   |                 |                |             |
|             | 新ビオフェルミンS                               | 2/3       | I                   | -        |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
| l           | 岩城製薬ビタミンC アスコルビン                        |           |                     | -        |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
| サ<br>プ<br>リ | 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 | 0.2       | 飽和                  |          |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
| Ú           |   |           | 一価不飽和               |          |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
| メ           | Asahi エビオス錠                             | 1         | 多価不飽和               |          |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
| ント          | 新ビオフェルミンS                               | 2/3       | n-3 m               | g 594    |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
| '           | 岩城製薬ビタミンC アスコルビン                        |           | l 脂 n−6 l m         | g 499    |             |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
|             | ワダカルシューム末                               | 0.2       | 酸 n-6:n-3           | 0.8      | : 1         |               |             |             |                 |                   |                 |                |             |
|             |   |           | リノール酸 m             |          |             | 672           | 365         | 332         |                 |                   | 3922            | 2157           |             |
|             |   |           | αリノレン酸 m            | -        |             | 26            | 15          |             |                 |                   | 001             | 205            |             |
|             |   |           | EPA + DHA m         | -        |             | 26<br>1 : 1   | 15          |             |                 |                   | 691             | 365<br>1.5 : 1 |             |
|             |   |           | EPA : DHA m         | g 0.3    | : 1         | 1:1           | 1:1         |             |                 |                   | 1.5 : 1         | 1.5 : 1        |             |

| アミノ酸(参考)       |         |       |            |         |        |  |  |  |
|----------------|---------|-------|------------|---------|--------|--|--|--|
| このレシピで         | 担刑不主    | - z = | このレシピでの推奨量 |         |        |  |  |  |
|                | TERM CO | の里    | NI         | AAFCO   |        |  |  |  |
|                | /DM     | mg    | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乳深里里へ― |  |  |  |
| イソロイシン         | 1.2%    | 383   | 224        | 126     | 123    |  |  |  |
| ロイシン           | 2.0%    | 656   | 411        | 226     | 196    |  |  |  |
| リジン            | 1.9%    | 636   | 205        | 116     | 209    |  |  |  |
| メチオニン          | 0.6%    | 189   | 205        | 109     |        |  |  |  |
| シスチン           | 0.3%    | 94    |            |         |        |  |  |  |
| メチオニン・シスチン計    | 0.8%    | 280   | 392        | 216     | 143    |  |  |  |
| フェニルアラニン       | 1.1%    | 357   | 280        | 149     |        |  |  |  |
| チロシン           | 0.9%    | 302   |            |         |        |  |  |  |
| フェニルアラニン・チロシン言 | 2.0%    | 659   | 448        | 246     | 242    |  |  |  |
| スレオニン          | 1.0%    | 335   | 261        | 143     | 159    |  |  |  |
| トリプトファン        | 0.3%    | 98    | 86         | 46      | 53     |  |  |  |
| バリン            | 1.3%    | 440   | 299        | 163     | 129    |  |  |  |
| ヒスチジン          | 0.9%    | 305   | 116        | 63      | 60     |  |  |  |
| アルギニン          | 1.3%    | 428   | 205        | 116     | 169    |  |  |  |

| アミノ酸スコア(参考)    |      |          |               |               |                 |        |  |  |
|----------------|------|----------|---------------|---------------|-----------------|--------|--|--|
| このレシピで摂取       | できる量 | 窒素1gあたりの | 算定用評<br>1973年 | 点パタン<br>1985年 | アミノ酸スコアを計算する(%) |        |  |  |
| (mg)           |      | アミノ酸量    | (一般用)         | (2-5歳)        | (一般用)           | (2-5歳) |  |  |
| イソロイシン         | 383  | 317      | 250           | 180           | 127             | 176    |  |  |
| ロイシン           | 656  | 544      | 440           | 410           | 124             | 133    |  |  |
| リジン            | 636  | 527      | 340           | 360           | 155             | 146    |  |  |
| メチオニン・シスチン計    | 280  | 232      | 220           | 160           | 105             | 145    |  |  |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 659  | 546      | 380           | 390           | 144             | 140    |  |  |
| スレオニン          | 335  | 278      | 250           | 210           | 111             | 132    |  |  |
| トリプトファン        | 98   | 81       | 60            | 70            | 135             | 116    |  |  |
| バリン            | 440  | 364      | 310           | 220           | 117             | 166    |  |  |
| ヒスチジン          | 305  | 253      | -             | 120           | -               | 210    |  |  |
| 全窒素量(g)        | 1.2  |          |               |               |                 |        |  |  |

