

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.2%	425	224	140	136
ロイシン	2.0%	722	411	250	217
リジン	1.8%	680	205	129	232
メチオニン	0.6%	218	205	121	
シスチン	0.3%	122			
メチオニン・シスチン計	0.9%	339	392	239	158
フェニルアラニン	1.1%	418	280	166	
チロシン	0.9%	328			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	746	448	272	269
スレオニン	1.0%	377	261	158	177
トリプトファン	0.3%	117	86	52	59
バリン	1.3%	496	299	180	144
ヒスチジン	1.0%	381	116	70	66
アルギニン	1.4%	529	205	129	188

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	425	298	250	180	119	166
ロイシン	722	507	440	410	115	124
リジン	680	478	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	339	238	220	160	108	149
フェニルアラニン・チロシン計	746	524	380	390	138	134
スレオニン	377	265	250	210	106	126
トリプトファン	117	82	60	70	137	117
バリン	496	349	310	220	112	158
ヒスチジン	381	267	-	120	-	223
全窒素量(g)	1.4					

