

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	331	224	137	134
ロイシン	1.6%	565	411	245	213
リジン	1.5%	543	205	126	227
メチオニン	0.5%	180	205	119	
シスチン	0.3%	97			
メチオニン・シスチン計	0.8%	276	392	235	155
フェニルアラニン	0.9%	323	280	162	
チロシン	0.7%	257			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	580	448	267	264
スレオニン	0.9%	314	261	155	173
トリプトファン	0.3%	92	86	51	58
バリン	1.1%	394	299	177	141
ヒスチジン	0.8%	277	116	69	65
アルギニン	1.2%	437	205	126	184

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	331	291	250	180	116	162
ロイシン	565	497	440	410	113	121
リジン	543	478	340	360	140	133
メチオニン・シスチン計	276	243	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	580	510	380	390	134	131
スレオニン	314	276	250	210	110	131
トリプトファン	92	81	60	70	135	115
バリン	394	346	310	220	112	157
ヒスチジン	277	244	-	120	-	203
全窒素量(g)	1.1					

