

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	378	224	149	146
ロイシン	1.7%	655	411	267	232
リジン	1.5%	584	205	138	248
メチオニン	0.5%	200	205	130	
シスチン	0.3%	122			
メチオニン・シスチン計	0.8%	321	392	256	169
フェニルアラニン	1.0%	389	280	177	
チロシン	0.8%	298			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	687	448	291	287
スレオニン	0.9%	338	261	169	189
トリプトファン	0.3%	104	86	55	63
バリン	1.2%	465	299	193	153
ヒスチジン	0.7%	267	116	75	71
アルギニン	1.2%	455	205	138	201

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	378	298	250	180	119	165
ロイシン	655	516	440	410	117	126
リジン	584	460	340	360	135	128
メチオニン・シスチン計	321	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	687	541	380	390	142	139
スレオニン	338	267	250	210	107	127
トリプトファン	104	82	60	70	137	117
バリン	465	367	310	220	118	167
ヒスチジン	267	211	-	120	-	175
全窒素量(g)	1.3					

