

| アミノ酸(参考) | | | | | |
|----------------|--------------|-----|------------|---------|---------|
| | このレシビで摂取できる量 | | このレシビでの推奨量 | | |
| | /DM | mg | NRC | | AAFCO |
| | | | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乾燥重量ベース |
| イソロイシン | 1.0% | 280 | 224 | 107 | 105 |
| ロイシン | 1.7% | 483 | 411 | 192 | 167 |
| リジン | 1.7% | 474 | 205 | 99 | 178 |
| メチオニン | 0.6% | 156 | 205 | 93 | |
| シスチン | 0.3% | 81 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.8% | 237 | 392 | 184 | 121 |
| フェニルアラニン | 1.0% | 285 | 280 | 127 | |
| チロシン | 0.8% | 221 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 1.8% | 506 | 448 | 209 | 206 |
| スレオニン | 0.9% | 266 | 261 | 121 | 136 |
| トリプトファン | 0.3% | 77 | 86 | 40 | 45 |
| バリン | 1.2% | 338 | 299 | 138 | 110 |
| ヒスチジン | 0.9% | 245 | 116 | 54 | 51 |
| アルギニン | 1.3% | 370 | 205 | 99 | 144 |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| このレシビで摂取できる量 (mg) | 窒素1gあたりの アミノ酸量 | 算定用評点パターン | | アミノ酸スコアを計算する(%) | | |
| | | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | 1973年 (一般用) | 1985年 (2-5歳) | |
| | | イソロイシン | 280 | 291 | 250 | 180 |
| ロイシン | 483 | 501 | 440 | 410 | 114 | 122 |
| リジン | 474 | 492 | 340 | 360 | 145 | 137 |
| メチオニン・シスチン計 | 237 | 246 | 220 | 160 | 112 | 154 |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 506 | 525 | 380 | 390 | 138 | 135 |
| スレオニン | 266 | 276 | 250 | 210 | 111 | 132 |
| トリプトファン | 77 | 80 | 60 | 70 | 133 | 114 |
| バリン | 338 | 351 | 310 | 220 | 113 | 159 |
| ヒスチジン | 245 | 254 | - | 120 | - | 212 |
| 全窒素量(g) | 1.0 | | | | | |

