

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.3%	350	224	105	102
ロイシン	2.1%	593	411	188	163
リジン	2.1%	577	205	97	174
メチオニン	0.7%	187	205	91	
シスチン	0.3%	96			
メチオニン・シスチン計	1.0%	283	392	179	119
フェニルアラニン	1.2%	338	280	124	
チロシン	1.0%	269			
フェニルアラニン・チロシン計	2.2%	607	448	204	201
スレオニン	1.1%	313	261	119	132
トリプトファン	0.3%	94	86	39	44
バリン	1.5%	409	299	135	108
ヒスチジン	1.2%	333	116	52	50
アルギニン	1.5%	424	205	97	141

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	350	306	250	180
ロイシン	593	518	440	410	118	126
リジン	577	504	340	360	148	140
メチオニン・シスチン計	283	247	220	160	112	155
フェニルアラニン・チロシン計	607	530	380	390	140	136
スレオニン	313	274	250	210	109	130
トリプトファン	94	82	60	70	136	117
バリン	409	358	310	220	115	163
ヒスチジン	333	291	-	120	-	243
全窒素量(g)	1.1					

