



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.2%	339	224	104	101
ロイシン	2.1%	584	411	186	161
リジン	2.1%	562	205	96	172
メチオニン	0.7%	185	205	90	
シスチン	0.3%	92			
メチオニン・シスチン計	1.0%	276	392	178	118
フェニルアラニン	1.2%	329	280	123	
チロシン	1.0%	274			
フェニルアラニン・チロシン計	2.2%	603	448	202	200
スレオニン	1.1%	310	261	118	131
トリプトファン	0.3%	93	86	38	44
バリン	1.5%	404	299	134	107
ヒスチジン	1.0%	282	116	52	49
アルギニン	1.6%	435	205	96	139

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	339	299	250	180
ロイシン	584	514	440	410	117	125
リジン	562	495	340	360	146	138
メチオニン・シスチン計	276	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	603	531	380	390	140	136
スレオニン	310	273	250	210	109	130
トリプトファン	93	82	60	70	137	117
バリン	404	356	310	220	115	162
ヒスチジン	282	249	-	120	-	207
全窒素量(g)	1.1					

