

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	145	224	54	52
ロイシン	1.7%	243	411	96	83
リジン	1.4%	203	205	49	89
メチオニン	0.5%	76	205	46	
シスチン	0.4%	54			
メチオニン・シスチン計	0.9%	130	392	92	61
フェニルアラニン	1.0%	143	280	63	
チロシン	0.8%	116			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	259	448	104	103
スレオニン	0.9%	123	261	61	68
トリプトファン	0.3%	40	86	20	23
バリン	1.3%	180	299	69	55
ヒスチジン	0.5%	76	116	27	25
アルギニン	1.0%	148	205	49	72

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	145	319	250	180	127	177
ロイシン	243	533	440	410	121	130
リジン	203	444	340	360	131	123
メチオニン・シスチン計	130	285	220	160	129	178
フェニルアラニン・チロシン計	259	567	380	390	149	145
スレオニン	123	270	250	210	108	128
トリプトファン	40	87	60	70	145	125
バリン	180	394	310	220	127	179
ヒスチジン	76	166	-	120	-	138
全窒素量(g)	0.5					

