

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	321	224	112	109
ロイシン	1.9%	550	411	200	174
リジン	1.8%	523	205	103	185
メチオニン	0.6%	176	205	97	
シスチン	0.3%	87			
メチオニン・シスチン計	0.9%	262	392	191	127
フェニルアラニン	1.0%	308	280	132	
チロシン	0.8%	250			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	558	448	218	215
スレオニン	1.0%	295	261	127	141
トリプトファン	0.3%	87	86	41	47
バリン	1.3%	375	299	144	115
ヒスチジン	0.9%	273	116	56	53
アルギニン	1.4%	398	205	103	150

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	321	292	250	180	117	162
ロイシン	550	500	440	410	114	122
リジン	523	476	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	262	239	220	160	108	149
フェニルアラニン・チロシン計	558	508	380	390	134	130
スレオニン	295	268	250	210	107	128
トリプトファン	87	79	60	70	132	113
バリン	375	341	310	220	110	155
ヒスチジン	273	248	-	120	-	207
全窒素量(g)	1.1					

