

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	366	224	141	138
ロイシン	1.7%	633	411	253	219
リジン	1.5%	571	205	130	234
メチオニン	0.5%	192	205	123	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.8%	302	392	242	160
フェニルアラニン	1.0%	364	280	167	
チロシン	0.8%	290			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	654	448	275	271
スレオニン	0.9%	331	261	160	178
トリプトファン	0.3%	102	86	52	59
バリン	1.2%	432	299	182	145
ヒスチジン	0.8%	289	116	71	67
アルギニン	1.2%	461	205	130	190

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	366	292	250	180	117	162
ロイシン	633	506	440	410	115	123
リジン	571	456	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	302	241	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	654	522	380	390	137	134
スレオニン	331	265	250	210	106	126
トリプトファン	102	81	60	70	136	116
バリン	432	345	310	220	111	157
ヒスチジン	289	231	-	120	-	192
全窒素量(g)	1.3					

