



アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	347	224	125
ロイシン	1.8%	594	411	223
リジン	1.7%	562	205	115
メチオニン	0.6%	192	205	108
シスチン	0.3%	94		
メチオニン・シスチン計	0.9%	285	392	213
フェニルアラニン	1.0%	329	280	148
チロシン	0.8%	269		
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	598	448	243
スレオニン	1.0%	321	261	141
トリプトファン	0.3%	94	86	46
バリン	1.3%	411	299	161
ヒスチジン	0.9%	284	116	62
アルギニン	1.3%	436	205	115

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	347	298	250	180
ロイシン	594	510	440	410	116	124
リジン	562	483	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	285	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	598	513	380	390	135	132
スレオニン	321	275	250	210	110	131
トリプトファン	94	80	60	70	134	115
バリン	411	353	310	220	114	160
ヒスチジン	284	244	-	120	-	203
全窒素量(g)	1.2					

