

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	395	224	145	141
ロイシン	1.8%	690	411	259	225
リジン	1.7%	630	205	133	240
メチオニン	0.6%	213	205	126	
シスチン	0.3%	117			
メチオニン・シスチン計	0.9%	330	392	248	164
フェニルアラニン	1.0%	397	280	171	
チロシン	0.8%	321			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	718	448	282	278
スレオニン	0.9%	361	261	164	183
トリプトファン	0.3%	110	86	53	61
バリン	1.2%	475	299	187	149
ヒスチジン	0.8%	316	116	72	69
アルギニン	1.3%	480	205	133	194

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	395	293	250	180	117	163
ロイシン	690	512	440	410	116	125
リジン	630	468	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	330	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	718	532	380	390	140	136
スレオニン	361	268	250	210	107	127
トリプトファン	110	82	60	70	136	117
バリン	475	353	310	220	114	160
ヒスチジン	316	234	-	120	-	195
全窒素量(g)	1.3					

