

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量			
		NRC		AAFCO	
		/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	428	224	147	143
ロイシン	1.9%	749	411	262	228
リジン	1.7%	667	205	135	243
メチオニン	0.6%	237	205	127	
シスチン	0.4%	139			
メチオニン・シスチン計	1.0%	376	392	251	166
フェニルアラニン	1.1%	434	280	174	
チロシン	0.9%	341			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	775	448	286	282
スレオニン	1.0%	395	261	166	185
トリプトファン	0.3%	120	86	54	62
バリン	1.3%	520	299	189	151
ヒスチジン	0.9%	335	116	73	69
アルギニン	1.3%	519	205	135	197

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	428	294	250	180	118	163
ロイシン	749	514	440	410	117	125
リジン	667	458	340	360	135	127
メチオニン・シスチン計	376	258	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	775	532	380	390	140	136
スレオニン	395	271	250	210	109	129
トリプトファン	120	82	60	70	137	117
バリン	520	357	310	220	115	162
ヒスチジン	335	230	-	120	-	192
全窒素量(g)	1.5					

