

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	381	224	157	153
ロイシン	1.6%	658	411	282	244
リジン	1.4%	598	205	145	261
メチオニン	0.5%	227	205	137	
シスチン	0.3%	125			
メチオニン・シスチン計	0.9%	353	392	269	178
フェニルアラニン	0.9%	387	280	186	
チロシン	0.7%	298			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	685	448	307	303
スレオニン	0.9%	355	261	178	199
トリプトファン	0.3%	110	86	58	66
バリン	1.1%	462	299	203	162
ヒスチジン	0.9%	367	116	79	75
アルギニン	1.3%	527	205	145	211

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	381	279	250	180	112	155
ロイシン	658	481	440	410	109	117
リジン	598	437	340	360	129	121
メチオニン・シスチン計	353	258	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	685	501	380	390	132	128
スレオニン	355	260	250	210	104	124
トリプトファン	110	80	60	70	134	114
バリン	462	338	310	220	109	154
ヒスチジン	367	268	-	120	-	224
全窒素量(g)	1.4					

