

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	372	224	145	141
ロイシン	1.7%	629	411	259	225
リジン	1.5%	563	205	133	240
メチオニン	0.5%	208	205	126	
シスチン	0.3%	126			
メチオニン・シスチン計	0.9%	335	392	248	164
フェニルアラニン	1.0%	372	280	171	
チロシン	0.7%	283			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	655	448	282	278
スレオニン	0.9%	326	261	164	183
トリプトファン	0.3%	102	86	53	61
バリン	1.2%	451	299	187	149
ヒスチジン	0.8%	306	116	72	69
アルギニン	1.2%	452	205	133	194

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
（mg）						
イソロイシン	372	304	250	180	122	169
ロイシン	629	514	440	410	117	125
リジン	563	460	340	360	135	128
メチオニン・シスチン計	335	273	220	160	124	171
フェニルアラニン・チロシン計	655	535	380	390	141	137
スレオニン	326	266	250	210	107	127
トリプトファン	102	83	60	70	138	119
バリン	451	369	310	220	119	168
ヒスチジン	306	250	-	120	-	208
全窒素量(g)	1.2					

