

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	394	224	153
ロイシン	1.7%	686	411	274
リジン	1.5%	611	205	141
メチオニン	0.5%	210	205	133
シスチン	0.3%	128		
メチオニン・シスチン計	0.8%	337	392	262
フェニルアラニン	1.0%	400	280	181
チロシン	0.8%	306		
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	706	448	298
スレオニン	0.9%	357	261	173
トリプトファン	0.3%	112	86	56
バリン	1.2%	464	299	197
ヒスチジン	0.9%	366	116	77
アルギニン	1.2%	498	205	141

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	394	291	250	180
ロイシン	686	506	440	410	115	123
リジン	611	450	340	360	132	125
メチオニン・シスチン計	337	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	706	521	380	390	137	134
スレオニン	357	264	250	210	105	126
トリプトファン	112	83	60	70	138	118
バリン	464	342	310	220	110	155
ヒスチジン	366	270	-	120	-	225
全窒素量(g)	1.4					

