

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	272	224	106	103
ロイシン	1.6%	457	411	189	164
リジン	1.6%	450	205	98	176
メチオニン	0.6%	159	205	92	
シスチン	0.3%	77			
メチオニン・シスチン計	0.8%	235	392	181	120
フェニルアラニン	0.9%	255	280	125	
チロシン	0.7%	204			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	460	448	206	203
スレオニン	0.9%	255	261	120	134
トリプトファン	0.3%	75	86	39	45
バリン	1.1%	314	299	137	109
ヒスチジン	1.0%	284	116	53	50
アルギニン	1.3%	360	205	98	142

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	272	296	250	180
ロイシン	457	497	440	410	113	121
リジン	450	490	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	235	256	220	160	116	160
フェニルアラニン・チロシン計	460	500	380	390	132	128
スレオニン	255	278	250	210	111	132
トリプトファン	75	82	60	70	137	117
バリン	314	341	310	220	110	155
ヒスチジン	284	309	-	120	-	258
全窒素量(g)	0.9					

