



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	328	224	123	119
ロイシン	1.8%	571	411	219	190
リジン	1.6%	517	205	113	203
メチオニン	0.6%	184	205	106	
シスチン	0.3%	113			
メチオニン・シスチン計	0.9%	297	392	210	139
フェニルアラニン	1.1%	340	280	145	
チロシン	0.8%	255			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	595	448	239	235
スレオニン	1.0%	307	261	139	155
トリプトファン	0.3%	96	86	45	52
バリン	1.2%	394	299	158	126
ヒスチジン	1.0%	325	116	61	58
アルギニン	1.3%	434	205	113	164

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	328	280	250	180
ロイシン	571	488	440	410	111	119
リジン	517	442	340	360	130	123
メチオニン・シスチン計	297	254	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	595	508	380	390	134	130
スレオニン	307	262	250	210	105	125
トリプトファン	96	82	60	70	137	117
バリン	394	337	310	220	109	153
ヒスチジン	325	277	-	120	-	231
全窒素量(g)	1.2					

