

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	299	217	138	135
ロイシン	1.4%	511	397	247	214
リジン	1.3%	483	199	127	229
メチオニン	0.5%	193	199	120	
シスチン	0.3%	112			
メチオニン・シスチン計	0.8%	306	379	236	156
フェニルアラニン	0.8%	301	271	164	
チロシン	0.6%	231			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	532	434	269	265
スレオニン	0.8%	286	253	156	174
トリプトファン	0.3%	99	83	51	58
バリン	1.0%	365	289	178	142
ヒスチジン	1.1%	413	112	69	65
アルギニン	1.3%	466	199	127	185

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	299	259	250	180	103	144
ロイシン	511	441	440	410	100	108
リジン	483	417	340	360	123	116
メチオニン・シスチン計	306	264	220	160	120	165
フェニルアラニン・チロシン計	532	460	380	390	121	118
スレオニン	286	247	250	210	99	118
トリプトファン	99	85	60	70	142	122
バリン	365	315	310	220	102	143
ヒスチジン	413	357	-	120	-	298
全窒素量(g)	1.2					

