

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	291	217	145	141
ロイシン	1.3%	489	397	259	225
リジン	1.3%	487	199	133	240
メチオニン	0.4%	168	199	126	
シスチン	0.2%	90			
メチオニン・シスチン計	0.7%	258	379	247	164
フェニルアラニン	0.7%	279	271	171	
チロシン	0.6%	218			
フェニルアラニン・チロシン計	1.3%	497	434	282	278
スレオニン	0.7%	283	253	164	183
トリプトファン	0.2%	82	83	53	61
バリン	0.9%	345	289	186	148
ヒスチジン	0.7%	262	112	72	69
アルギニン	1.1%	402	199	133	194

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	291	272	250	180	109	151
ロイシン	489	456	440	410	104	111
リジン	487	454	340	360	133	126
メチオニン・シスチン計	258	241	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	497	463	380	390	122	119
スレオニン	283	264	250	210	105	126
トリプトファン	82	77	60	70	128	110
バリン	345	321	310	220	104	146
ヒスチジン	262	244	-	120	-	203
全窒素量(g)	1.1					

